

Rådgör alltid med din veterinär innan du behandlar.

Om sår som är gapande eller sitter nära kotled, kronled och hovled skall veterinär omgående kontaktas.

Sårbehandling

Trimma gärna hårremmen runt såret för att det skall hållas rent och inte infekteras av hårstråna.

Rengör såret grundligt genom att spruta koksalt direkt i såret och rengör även med dränkt bomull.



Lägg därefter Sorbact kompressen mot såret. Sorbact kompress är ett bakterie- och svampbindande sårförband. Den kan användas i förebyggande syfte samt när såret är infekterat.

Sedan börjar bandageringen med polstervadd. Polstervadd är komprimerad bomull. Den gör att bandageringen håller kompress och resten av bandageringen stabil och motverkar att det glider.





Därefter tas en passande längd av bomullsrullen. Linda bomullen slät över polstervadden.

Bandagera därefter lätt med oelastisk gasbinda utan att dra åt.

Sedan lindas vetrap över gasbindan. Vetrap är elastisk och fästande linda, den får därför inte dras åt. Detta kan göra skada på senorna.



För att täppa till öppningarna så smuts inte kommer in i bandaget, eller för ytterligare stabilitet kan Tensoplast klisterlinda tejpas på huden och bandageringen.

Tensoplast klisterlinda skall användas med försiktighet. Den är väldigt stark och elastisk, så den skall läggas väldigt lätt och försiktigt på, den får inte dras åt. Den får inte sättas över kotled, kronled eller hovled.

Bandaget kan sitta upp till 3 dagar om det hålls torrt och rent.